

DIATER Veneno de Himenópteros

Vacuna alérgica de los componentes activos del veneno de himenópteros, para inmunoterapia específica.

COMPOSICIÓN

Extracto liofilizado de los componentes alérgicamente activos y cuantificados de veneno de himenópteros. Se reconstituyen con solución salina fisiológica fenolada.

INDICACIONES

Para el tratamiento de la alergia mediada por IgE a Veneno de Himenópteros

PRESENTACIÓN

| Vial n° | Color de la etiqueta |
|---------|----------------------|
| 0 | Gris |
| 1 | Verde |
| 2 | Amarilla |
| 3 | Roja |

TRATAMIENTO DE INICIO

H1: Envase conteniendo nueve viales (0-1-2-2-3-3-3-3-3) y diez viales de diluyente.

TRATAMIENTO DE CONTINUACIÓN

H2: Envase conteniendo cuatro viales (3-3-3-3) y cinco viales de diluyente.

Tratamiento de inicio:

| Vial (color/n°) | Volumen a inyectar | Dosis | Intervalo de Administración |
|-----------------|--------------------|---------|-----------------------------|
| 0 | 0,1 mL | 0,01 µg | Semana 1 Día 1 |
| 1 | 0,1 mL | 0,1 µg | Semana 2 Día 8 |
| 2 | 0,1 mL | 1 µg | Semana 3 Día 15 |
| | 0,5 mL* | 5 µg | Semana 4 Día 22 |
| 3 | 0,1 mL* | 10 µg | Semana 5 Día 29 |
| | 0,2 mL* | 20 µg | Semana 6 Día 36 |
| | 0,3 mL* | 30 µg | Semana 7 Día 43 |
| | 0,4 mL* | 40 µg | Semana 8 Día 50 |
| | 0,5 mL * | 50 µg | Semana 9 Día 57 |
| | 0,6 mL * | 60 µg | Semana 10 Día 64 |
| | 0,8 mL * | 80 µg | Semana 11 Día 71 |
| | 1 mL * | 100 µg | Semana 12 Día 78 |

* Se recomienda que estas dosis sean divididas en 2 partes iguales, administradas con un intervalo de 30 minutos, para evitar la posibilidad de reacciones adversas.

Tratamiento de continuación:

| Vial (color/n°) | Volumen a inyectar | Dosis | Intervalo de Administración |
|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------|
| 3 | 1 mL * | 100 µg | Semana 14 Día 92 |
| | 1 mL * | 100 µg | Semana 17 Día 113 |
| | 1 mL * | 100 µg | Semana 21 Día 141 |
| | 1 mL * | 100 µg | Semana 25 Día 169 |

* Se recomienda que estas dosis sean divididas en 2 partes iguales, administradas con un intervalo de 30 minutos, para evitar la posibilidad de reacciones adversas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Inyectable por vía subcutánea

PAUTA DE ADMINISTRACIÓN RECOMENDADA

La pauta recomendada por el laboratorio está sujeta a cualquier modificación que el especialista considere necesaria.

ALÉRGENOS DISPONIBLES PARA HIMENÓPTEROS

VENENO DE HIMENÓPTEROS

Apis mellifera

Vespula sp

Polistes sp



- Estandarizados en concentración de alérgeno (s) mayor (es)
- ◊ Estandarizados en Unidades Biológicas

